eduresourceza.com

Downloaded from eduresourceza.com

INFORMATION SHEET

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$T_n = a + (n-1)d \qquad S_n = \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right]$$

$$T_n = ar^{n-1} \qquad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\ ;\ r \neq 1 \qquad S_\infty = \frac{a}{1-r}\ ;\ -1 < r < 1$$

$$\log A^n = n\log A;\ \text{and} \qquad \log_B A = \frac{\log A}{\log B}$$

$$\log_b(AB) = \log_b A + \log_b B \qquad \log_b\left(\frac{A}{B}\right) = \log_b A - \log_b B$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$A = P(1 + ni) \qquad A = P(1 - ni)$$

$$A = P(1+i)^n \qquad A = P(1-i)^n$$

$$F = x\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \qquad P = x\left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}\right]$$

Downloaded from eduresourceza.com

Downloaded from eduresourceza.com

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \qquad M\left(\frac{x_1 + x_2}{2} ; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

$$y = mx + c \qquad y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad m = \tan\theta$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

In ΔABC:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$$

$$area\ \Delta ABC = \frac{1}{2}ab.\sin C$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha.\cos\beta + \cos\alpha.\sin\beta \qquad \sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha.\cos\beta - \cos\alpha.\sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha.\cos\beta - \sin\alpha.\sin\beta \qquad \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha.\cos\beta + \sin\alpha.\sin\beta$$

$$\cos 2\alpha = \begin{cases} \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \\ 1 - 2\sin^2\alpha \\ 2\cos^2\alpha - 1 \end{cases} \qquad \sin 2\alpha = 2\sin\alpha.\cos\alpha$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{n} \qquad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \qquad P(A\ or\ B) = P(A) + P(B) - P(A\ and\ B)$$

$$\hat{y} = a + bx \qquad b = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$$

Downloaded from eduresourceza.com
IEB Copyright © 2022